

Inkuilen

Gebruik voor elke kuil het juiste middel. Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en met een goede voederwaarde biedt veel voordelen. Niet alleen de productie gaat omhoog maar ook de gezondheid van de dieren. Elk middel heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Met name de hoogte van het drogestof-gehalte speelt een rol bij de keuze voor een bepaald inkuilmiddel.

Bonsilage Mais

Vermindert inkuilverliezen maiskuilen

- Specifiek samengesteld voor snijmais en GPS
- 100% EU goedgekeurde bacteriestammen
- Meer energie in de kuil (20-30 VEM kg/ds)
- Remt de broei
- 1000 keer minder gisten en schimmels
- Betere smakelijkheid
- Zeer gezond voor uw vee door meer melkzuur en propaandiol
- Hoog rendement 1:3



Maiskuil met meer energie

Toevoeging van Bonsilage Mais in de maiskuil voorkomt verlies van kostbare energie. Mais is een energiebron voor gisten, schimmels en boterzuurbacteriën. Bij opening van de kuil worden gisten en schimmels direct actief en veroorzaken broei in de maiskuil. Hierdoor gaat 12% van de energie (100 VEM in 5 dagen) in de maiskuil verloren. Met Bonsilage Mais is de maiskuil na 6 tot 8 weken stabiel en blijft na opening lange tijd vrij van broei en schimmel.

Melkzuur in de maiskuil

Iedere maiskuil heeft van nature melkzuurbacteriën. Melkzuurbacteriën bestrijden gisten. Gisten kunnen echter een hoge concentratie melkzuurbacteriën verdragen. Pas bij een concentratie van 5% is er een duidelijke remming. Deze concentratie melkzuurbacteriën wordt zonder toevoegmiddel zelden of nooit behaald. Bonsilage Mais is samengesteld uit azijnzuur- en melkzuurvormende bacteriën. Deze versnellen het inkuilproces en remmen gist en schimmelvorming. Alle bacteriestammen in de Bonsilage mais zijn EU goedgekeurde bacteriestammen en zijn beoordeeld op de werking als kuilverbeteraar.

Gezonder voer in de maiskuil

Maiskuilen behandeld met Bonsilage Mais zijn smakelijker door de snelle conservering en de aanwezigheid van melkzuren. Koeien nemen het voer makkelijk op en leveren daardoor meer melk. Mais zonder schimmels en gisten is gezonder voor de koe. Hierdoor hebben koeien meer pensbacteriën die zorgen voor meer melkeiwit.

Toprendement

Door toevoeging van Bonsilage Mais vreet de koe meer ruwvoer en haalt meer melk per kilo mais. Dit gecombineerd met 12% minder inkuilverlies wordt iedere euro zes keer terugbetaald.

Dosering

Bonsilage Mais vloeibaar. Inhoud verpakking: 100 gram. Dosering 1 gram per ton mais (1 potje per 2 tot 2,5 ha snijmais).

Bonsilage Mais granulaat. Inhoud verpakking: 20 kg. Dosering 250 gram per ton mais.

- ☒ **Snijmaïs**
- ☐ **Gras**
- ☐ **CCM**

Eigenschappen

Broeiremming



Schimmelremming



Smaakverbetering



Laagste kosten



Optimale penswerking



Hoge levensproductie



Opneembare energie



Minimale conserveringsverliezen



Snijvlakbehandeling



Hoogste melkproductie per koe



Voeren binnen 8 weken



Voeren na 8 weken



Toplaagbehandeling



Specificaties

Granulaat dosering	0.25 kg/ton mais
Wateroplosbaar poeder	1 gram/ton mais
Ook geschikt voor	biologisch land
Voor kuilen met een droge stof	van 28 tot 38%

Inkuilen

Gebruik voor elke kuil het juiste middel. Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en met een goede voederwaarde biedt veel voordelen. Niet alleen de productie gaat omhoog maar ook de gezondheid van de dieren. Elk middel heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Met name de hoogte van het drogestof-gehalte speelt een rol bij de keuze voor een bepaald inkuilmiddel.

- ☒ **Snijmaïs**
- ☐ **Gras**
- ☐ **CCM**

Eigenschappen

Broeiremming



Schimmelremming



Smaakverbetering



Laagste kosten



Optimale penswerking



Hoge levensproductie



Opneembare energie



Minimale conserveringsverliezen



Snijvlakbehandeling



Hoogste melkproductie per koe



Voeren binnen 8 weken



Voeren na 8 weken



Toplaagbehandeling

