



Bonsilage Speed mais

Voeren twee weken na inkuilen

- Snel kuilmais beschikbaar bij ruwvoertekort in september/oktober
- Zeer snelle broeieremming en conservering na inkuilen
- Voor een gezonde penswerking
- Snelle doding van schimmels en gisten lactobactilus Diolivorians
- Ook geschikt voor toplaagbehandeling



Snel kuilmais beschikbaar bij ruwvoertekort in september/oktober

Maiskuilen die behandeld worden met Bonsilage Speed mais zijn na twee weken geconserveerd en geschikt om de mais te voeren aan het vee. Zonder toevoeging van Bonsilage Speed moet een maiskuil minimaal 8 weken volledig afgesloten zijn voor een goede conservering en broeieremming.

Zeer snelle conservering en broeieremming

Bonsilage Speed mais zorgt voor een zeer snelle conservering en broeieremming. Tijdens de conservering wordt er azijnzuur gevormd die schimmels en gisten grotendeels uitschakelen. Bonsilage Speed mais versnelt dit proces en is dus een ideaal voor veehouders die snel willen voeren van de nieuwe maisoogst.

Inkuilen

Gebruik voor elke kuil het juiste middel. Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en met een goede voederwaarde biedt veel voordelen. Niet alleen de productie gaat omhoog maar ook de gezondheid van de dieren. Elk middel heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Met name de hoogte van het drogestof-gehalte speelt een rol bij de keuze voor een bepaald inkuilmiddel.

- ☒ **Snijmaïs**
- ☐ **Gras**
- ☐ **CCM**

Eigenschappen

Broeieremming



Schimmelremming



Smaakverbetering



Laagste kosten



Optimale penswerking



Hoge levensproductie



Opneembare energie



Minimale conserveringsverliezen



Snijvlakbehandeling



Hoogste melkproductie per koe



Voeren binnen 8 weken



Voeren na 8 weken




Toplaagbehandeling



Verbeterde aerobische stabiliteit door Bonsilage Speed mais.

(snijmais 30% DS, openen na 15 dagen)



Voor een gezonde penswerking


Maiskuilen behandeld met Bonsilage Speed mais zijn al na twee weken geconserveerd, waardoor schimmels en gisten grotendeels gedood zijn. Schimmels in de mais maken gifstoffen aan die de penswerking van koeien ernstig kunnen verstoren. Verstoring van de penswerking moet u te allen tijde voorkomen, omdat een gezonde penswerking de basis is voor een hoge melkproductie met veel melkeiwit en gezonde koeien. Indien u 8 weken kunt wachten met het openen van de kuil, kies dan voor het toevoegmiddel Bonsilage Mais of Bonsilage Fit mais.

Unieke bacteriën *Lactobacillus Diliviorans*

Bonsilage Speed is uniek door de samenstelling van de bacteriesoorten *L. buchneri*, *L. diolivorans* (nieuw) en *L. rhamnosus*. De *L. diolivorans* zorgt voor een super snelle conservering en is alleen verkrijgbaar in de Bonsilage Speed producten. De *L. diolivorans* bacteriën maken in een zeer korte tijd een maximale hoeveelheid azijnzuur aan, waardoor de ontwikkeling schimmels en gisten in twee weken terug gebracht wordt naar een minimum. (zie tabel). Bonsilage Speed mais is geschikt voor natte en droge maiskuilen (25%-45% droge stof)

Tabel: De unieke bacteriën in Bonsilage Speed mais maken in een zeer korte tijd veel melkzuur en azijnzuur aan

Zuurpatroon met Bonsilage Speed mais



Geschikt voor toplaagbehandeling

Bonsilage Speed mais is door de aanmaak van een maximale hoeveelheid azijnzuur ook geschikt voor de behandeling van de toplaag. Voor het onderste gedeelte van de maiskuil kan Bonsilage Mais of Bonsilage Fit mais gebruikt worden.

Dosering

Inkuilen

Gebruik voor elke kuil het juiste middel. Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en met een goede voederwaarde biedt veel voordelen. Niet alleen de productie gaat omhoog maar ook de gezondheid van de dieren. Elk middel heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Met name de hoogte van het drogestof-gehalte speelt een rol bij de keuze voor een bepaald inkuilmiddel.

- ☒ **Snijmaïs**
- ☐ **Gras**
- ☐ **CCM**

Eigenschappen

Broeiremming



Schimmelremming



Smaakverbetering



Laagste kosten



Optimale penswerking



Hoge levensproductie



Opneembare energie



Minimale conserveringsverliezen



Snijvlakbehandeling



Hoogste melkproductie per koe



Voeren binnen 8 weken



Voeren na 8 weken



Toplaagbehandeling



2 gr Bonsilage Speed mais per ton verse mais In water oplossen. Met doseerpomp op de hakselaar over de mais verdelen.

Verpakking

Pot van 100 gram is geschikt voor 100 ton verse mais. (+/- 2 tot 2,5 ha mais)

Specificaties

Kosten inkuilmiddel	€1,70/ton silage
Dosering vloeibaar ton silage	1 gr oplossen
Verpakking oplosbaar poeder	100 gr
Houdbaarheid	24 maanden
Kwaliteit certificering	Eu-goedgekeurd
Kwaliteitswaarborg	GMP

Inkuilen

Gebruik voor elke kuil het juiste middel. Een smakelijke kuil zonder broei en schimmels en met een goede voederwaarde biedt veel voordelen. Niet alleen de productie gaat omhoog maar ook de gezondheid van de dieren. Elk middel heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Met name de hoogte van het drogestof-gehalte speelt een rol bij de keuze voor een bepaald inkuilmiddel.

- ☒ **Snijmaïs**
- ☐ **Gras**
- ☐ **CCM**

Eigenschappen

Broeiremming



Schimmelremming



Smaakverbetering



Laagste kosten



Optimale penswerking



Hoge levensproductie



Opneembare energie



Minimale conserveringsverliezen



Snijvlakbehandeling



Hoogste melkproductie per koe



Voeren binnen 8 weken



Voeren na 8 weken



Toplaagbehandeling

