

Conservering van snijmais

Broei in de kuil kan 10 tot 20 procent minder drogestofopname tot gevolg hebben.
 Schimmels en bacteriën in de kuil worden actief door de toetreding van lucht.
 Dit komt de smakelijkheid niet ten goede.
 Door broei neemt de voederwaarde af met 20 tot 30 VEM per dag.



Groep 2

Broei vermijden in snijmais met BONSILAGE MAIS

BONSILAGE MAIS, een specifiek inkuilmiddel voor snijmais op basis van homo- en heterofermentatieve melkzuurbacteriën, werkt een goede verhouding van gevormde fermentatiezuren (melkzuur, azijnzuur) in de hand. Deze combinatie van gevormde zuren levert een zeer smakelijk product op en onderdrukt de ontwikkeling van gisten en schimmels en bijgevolg mycotoxines.

BONSILAGE MAIS beschermt de voedingsstoffen tegen opwarming en verhoogt de energiedichtheid.

Verpakking en prijs: 20 kg granulaat (124.32 €) voor 40 ton mais of potje 100 g (153.13 €) voor 50 ton mais te behandelen. Prijzen excl. btw.


Economische haalbaarheid BONSILAGE MAIS:

1 ha mais 50 ton verse massa à 30 % DS en 960 VEM

Minder inkuilverliezen	%	3
Minder broei	%	min. 5
Hogere verteerbaarheid		+ 30 VEM
Voordeel Bonsilage Mais*	€/ha	236
Kost Bonsilage Mais	€/ha	76
Netto voordeel	€/ha	160

* 0.15 € per kVEM

■ onbehandeld ■ BONSILAGE MAIS



** VS: verse stof



Toplaag- en randbehandeling met SILOSTAR PROTECT

Om bederf te voorkomen in de top- en randlagen van kuilen wordt SILOSTAR PROTECT granulaat toegediend à ratio van 0.2-0.3 kg/m² (per laag van 10 cm dik) of aan 2-3 kg per ton. De zijkanalen worden tijdens het inkuilen laag voor laag behandeld. De specifieke combinatie van organische zouten (kaliumsorbaat, natriumbenzoaat en calciumformiaat) remt de ontwikkeling van schimmels en gisten in deze risicozones.

Verpakking: 25 kg granulaat

Kostprijs: 59 € per dosis, excl. btw.

